

# 5 ans après un examen des coronaires, la qualité de vie liée à la santé des malades est inégalement répartie entre eux

anastase.tchicaya@liser.lu


L'Organisation Mondiale de la Santé définit **la qualité de vie liée à la santé** comme « **Les perceptions des individus face à leur position dans la vie, au contexte des systèmes de valeurs sociales et culturelles dans lesquels ils vivent, sont en relation avec leurs buts, attentes, normes et problèmes** »

Sur une échelle allant de 0 à 100 points, un score élevé indique une meilleure qualité de vie liée à la santé.


Parmi les patients souffrant de maladies cardiovasculaires (MCV) dans le monde et au Luxembourg, l'inégalité entre leur qualité de vie liée à la santé est observée tant au niveau du sexe qu'au niveau du statut socioéconomique.

La qualité de vie liée à la santé est meilleure chez les patients ayant modifié leurs facteurs de risque.

5 ans après une coronarographie, la qualité de vie liée à la santé est meilleure chez les hommes que chez les femmes.




Après un événement cardiovasculaire, la qualité de vie liée à la santé est moins bonne chez les personnes moins éduquées.




Chez des personnes souffrant de MCV et ayant le diabète, ...

La qualité de vie liée à la santé physique est meilleure chez celles ayant perdu du poids ou celles dont le poids est resté stable par rapport à celles dont le poids a augmenté durant les 12 derniers mois.



La qualité de vie liée à la santé psychologique est également meilleure parmi les personnes ayant un niveau d'études supérieures comparée à celle des personnes ayant le niveau d'études primaires.



## Perspectives

- Promouvoir un diagnostic précoce de MCV chez les femmes lorsqu'elles présentent les mêmes facteurs de risque que les hommes
- Développer des programmes d'intervention, notamment dans le cadre de la prévention secondaire, ciblant davantage les personnes à faible niveau socioéconomique